

Giampietro AMBRUSCHI, Enrico CAIRO, Giovanni GIOVINE

OSSERVAZIONI ORNITOLOGICHE IN PROVINCIA DI BERGAMO

(1992-1997)

RIASSUNTO: Vengono riportate alcune osservazioni ornitologiche, ritenute di interesse locale, effettuate nella provincia di Bergamo e riferite a 23 specie. Esse riguardano segnalazioni relative sia a casi di nidificazione, accertati o presunti, sia ad avvistamenti al di fuori del periodo riproduttivo, riferibili di volta in volta a estivazioni, spostamenti migratori, erratismi o presenze invernali.

SUMMARY: This work reports some ornithological observations carried out in the Bergamo province (Northern Italy) in 1992-1997. The reported field observations concern breeding cases as well as wintering or migratory movements of 23 species.

PAROLE CHIAVE: Lombardia, Bergamo, Uccelli.

KEY WORDS: Lombardy, Bergamo, Aves.

SVASSO MAGGIORE (*Podiceps cristatus*)

Dopo la prima nidificazione accertata in provincia lungo il Fiume Adda (Cairo & Perugini, 1993), la specie ha colonizzato anche i bacini lacustri di Endine (8 coppie nel 1994) e dell'Alto Sebino.

GARZETTA (*Egretta garzetta*)

Un gruppo di 15 individui osservato il 15/6/1996 nel greto del F. Serio all'altezza di Martinengo. L'osservazione conferma la presenza crescente di individui estivanti lungo i principali corsi d'acqua della provincia.

CICOGNA NERA (*Ciconia nigra*)

Un individuo in migrazione è stato osservato il 10/5/1992 in alta Valle Seriana (M.te Timogno). Dopo una serie di volteggi si è allontanato in direzione sud-est.

***Anser* sp.**

Un branco di circa 70 individui osservato in località Ponti di Sedrina il giorno 8/3/1992 (ore 8) mentre risale "in formazione" lungo l'asse della Val Brembana, con volo alto e spedito. Il carattere dell'avvistamento non consente un'attribuzione sicura relativamente alle specie di "oche grigie" più comunemente osservabili nel nostro territorio (*Oca selvatica*, *Oca lombardella*, *Oca granaiola*).

MORETTA GRIGIA (*Aythya marila*)

Un esemplare di sesso maschile è stato osservato il 6/1/1995 lungo il Fiume Adda nei pressi del bacino di Trezzo, in compagnia di sei moriglioni (*A. ferina*) e di una moretta (*A. fuligula*). Si tratta della prima segnalazione della specie per la provincia bergamasca.

FALCO PESCATORE (*Pandion haliaetus*)

Un individuo osservato il 24/8/1994 lungo il Fiume Adda (bacino di Trezzo); prima di allontanarsi in direzione di S. Gervasio ha effettuato un tentativo di pesca.

FALCO PECCHIAIOLO (*Pernis apivorus*)

Tredici individui osservati simultaneamente la mattina del 4/9/1993 sui Colli di Bergamo (Località Astino). Dopo la risalita di correnti termiche con voli circolari si sono allontanati in direzione ovest.

BIANCONE (*Circaetus gallicus*)

Nel corso degli anni '90 la specie è stata ripetutamente avvistata sia nella bassa Valle Seriana (Monte di Nese) che nel comprensorio Val Cavallina - Lago d'Iseo. Gran parte delle osservazioni si riferiscono ai periodi migratori (fine marzo-aprile e seconda metà di agosto). Si segnalano osservazioni estive (7/7/1996, 24/6/1997) in località M.te Bronzone.

GIPETO (*Gypaetus barbatus*)

Riportiamo alcune recenti osservazioni di questa specie, oggetto di un programma di reintroduzione sull'arco alpino finanziato e gestito da WWF ed altri Enti internazionali. Le zone di rilascio più prossime al territorio bergamasco sono quelle del Parco Nazionale Svizzero (Bassa Engadina), dove i primi esemplari sono stati reintrodotti nel 1991.

I primi avvistamenti della specie in provincia, probabilmente riferibili ad un unico esemplare, hanno riguardato l'alta Val di Scalve: un giovane il 25/6/1992 in località Passo dei Campelli, e nel successivo mese di agosto, nella Valle del Gleno. Nel marzo 1993 è stato infine avvistato un esemplare in volo sopra il Lago d'Iseo (Marengoni com. pers.).

PELLEGRINO (*Falco peregrinus*)

Negli ultimi anni la specie è stata ripetutamente osservata nel comprensorio della bassa Valle Seriana. Nella primavera del 1995 una coppia ha presidiato un sito potenzialmente atto alla riproduzione, manifestando un comportamento spiccatamente territoriale; non sono stati tuttavia raccolti indizi di nidificazione.

FOLAGA (*Fulica atra*)

Nel luglio 1996 è stata documentata la riproduzione di alcune coppie presso il lido di Endine, posto sull'omonimo bacino lacustre della Val Cavallina.

TORTORA DAL COLLARE ORIENTALE (*Streptopelia decaocto*)

Una recente indagine distributiva ha evidenziato una sensibile espansione dell'areale in atto nell'alta pianura bergamasca (Cairo, 1993). Dati raccolti in tempi successivi confermano la tendenza alla colonizzazione del territorio provinciale. La specie è stata infatti osservata, oltre che in molte zone centrali e periferiche di Bergamo, anche ad Almenno S. Bartolomeo, Almenno S. Salvatore, Ambivere, Cisano Bergamasco, Grassobbio, Mapello, Nembro, Trescore Balneario e Villa d'Almè.

PICCHIO VERDE (*Picus viridis*)

Un recente caso di nidificazione della specie nel territorio provinciale, il primo da lungo tempo a questa parte, è stato documentato nei boschi dell'alta Valle Brembana (rivista "Orobie", aprile 1996). Negli ultimi anni la specie è stata da noi osservata, anche durante il periodo riproduttivo, in Valle di Scalve e, più regolarmente, nella Conca della Presolana.

RONDINE MONTANA (*Ptyonoprogne rupestris*)

La rondine montana ha recentemente colonizzato la zona di Bergamo Alta sia come specie nidificante (Guerra, 1989) che svernante (Cairo & Perugini, 1993). Nel corso degli ultimi anni anche in città bassa si sono verificati sia avvistamenti di individui svernanti che sporadici casi di nidificazione su grossi manufatti (Piazza Matteotti, 1995; viadotto di Boccaleone, 1996).

In provincia la specie sverna regolarmente anche lungo le sponde del Lago d'Iseo. Occasionalmente è stata osservata lungo il Fiume Adda (Trezzo). Un eccezionale caso di svernamento è stato documentato nella stagione 1991-'92 in località Ponti di Sedrina, in un tratto molto angusto della bassa Val Brembana. Un individuo è stato ripetutamente osservato mentre abbandonava, alle prime luci del giorno e con temperature spesso inferiori a 0° C, il rifugio notturno posto in una fessura tra le rocce di una galleria stradale dismessa.

CALANDRO MAGGIORE (*Anthus novaeseelandiae*)

Un esemplare è stato abbattuto il 5/11/1995 nei pressi di Mapello. Si tratta della prima segnalazione nota per la provincia di Bergamo.

CALANDRO (*Anthus campestris*)

Nel periodo estivo si osserva con una certa regolarità la presenza di alcuni individui nella zona di Monte di Nese, presso praterie aride poste a quote di circa 1000 metri. Analoghi biotopi localizzati delle Prealpi Lombarde ospitano piccole popolazioni nidificanti di questa specie (Brichetti & Fasola, 1990).

CODIROSSO SPAZZACAMINO (*Phoenicurus ochruros*) x CODIROSSO COMUNE (*P. phoenicurus*)

Un ibrido tra le due specie di codirosi è stato ripetutamente osservato in un'area suburbana di Bergamo (località Valtesse) nei mesi di aprile e maggio 1997. L'individuo, di sesso maschile, presentava caratteristiche intermedie sia nel piumaggio (dorso e ali marroni scuro, capo, gola e petto nerastri, fronte grigio chiara, ventre

aranciato, groppone e sottocoda rossi) che nel canto (simile a quello del codirosso spazzacamino ma quasi sempre privo della tipica nota finale). La zona era regolarmente frequentata anche da una coppia di codirosso comune, con la quale non sono stati osservati casi di interferenza o di competizione territoriale. Il codirosso spazzacamino ha recentemente colonizzato alcune zone di Bergamo Alta, non distanti dal luogo delle osservazioni riportate. Questo particolare biotopo urbano offre alle due specie l'opportunità di convivere in qualità di specie nidificanti.

PASSERO SOLITARIO (*Monticola solitarius*)

Due maschi osservati ed ascoltati in canto fra l' 8 ed il-21 dicembre 1996 a Bergamo Alta (Piazza Cittadella, S. Maria Maggiore). Il dato fa seguito a quelli riportati per la medesima zona in una precedente nota (Cairo & Perugini, 1993), confermando sporadici soggiorni della specie in questo particolare sito.

TORDO GOLAROSSA (*Turdus ruficollis ruficollis*)

Un individuo di sesso maschile è stato osservato e fotografato nei giorni 30/11 e 2/12/1994 sui Colli di Bergamo (località Astino). L'esemplare presentava la parte inferiore del becco rotta ed era privo delle timoniere esterne.

Questa sottospecie, di pertinenza siberica (Asia nord-orientale), si rinviene accidentalmente in Europa, mentre non sono note precedenti segnalazioni per l'Italia. La documentazione relativa all'osservazione è stata trasmessa al Comitato di Omologazione delle specie accidentali per una valutazione ufficiale del dato.

STERPAZZOLINA (*Sylvia cantillans*)

La presenza di una coppia con comportamento spiccatamente territoriale, e presumibilmente nidificante, è stata notata nella tarda primavera del 1994 e del 1996 sui Colli di Bergamo (Località Pascolo dei Tedeschi), su un declivio terrazzato invaso da vegetazione arbustiva. In base alla recente indagine regionale la nidificazione della specie in Lombardia appare limitata alla fascia collinare dell'Oltrepò Pavese (Brichetti & Fasola, 1990).

TACCOLA (*Corvus monedula*)

Dopo le prime segnalazioni provinciali di piccole colonie nidificanti (Cairo & Perugini, 1993), sono stati accertati ulteriori casi di nidificazione in città riguardanti singole coppie. Nel 1993 e nel 1996 è stato occupato un sito posto all'interno della Torre Civica (Piazza Vecchia); nel 1995 (3 *pulli*) e nel 1996 una coppia si è riprodotta all'interno della Torre dei Caduti (Piazza Vittorio Veneto), sito già occupato con esito negativo nel 1991. In entrambi i siti descritti, occupati anche nel 1997, la specie sfrutta per la nidificazione la cavità retrostante al perno dell'orologio.

CORVO IMPERIALE (*Corvus corax*)

Un gruppo composto da 25 individui osservato il 19/9/1994 nei pressi di Valzurio (alta Valle Seriana).

ZIGOLO NERO (*Emberiza cirlus*)

La presenza di questa specie lungo la fascia collinare prealpina lombarda è alquanto scarsa e localizzata (Brichetti & Fasola, 1990). Un maschio cantore è stato ripetutamente osservato dalla tarda estate del 1993 al giugno 1994 sui Colli di Bergamo (Località Fontana), in un territorio caratterizzato dalla compresenza di coltivi, aree cespugliate e rade alberature; nella medesima zona un maschio in canto osservato nei mesi di aprile e maggio del 1997. La specie è stata inoltre udita in canto (luglio 1995) sui rilievi collinari terrazzati prospicienti il Lago d'Iseo, in località Esmate (Solto Collina).

RINGRAZIAMENTI

Desideriamo ringraziare Riccardo Marengoni per le segnalazioni forniteci.

Consegnato dicembre 1997

BIBLIOGRAFIA

- BRICHETTI P. E FASOLA F., 1990 - Atlante degli Uccelli nidificanti in Lombardia. Ed. Ramperto, Brescia.
- CAFFI E., 1913 - Gli uccelli del Bergamasco. *Conti, Bergamo*.
- CAIRO E., 1993 - Distribuzione ed espansione della Tortora dal collare orientale, *Streptopelia decaocto*, in provincia di Bergamo. *Riv. Museo Civ. Sc. Nat. "E. Caffi"*, 16: 9-14.
- CAIRO E. E PERUGINI F., 1986 - Check-list degli uccelli nidificanti in provincia di Bergamo. *Riv. Museo Civ. Sc. Nat. "E. Caffi"*, 10: 39-49.
- CAIRO E. E PERUGINI F., 1993 - Interessanti osservazioni ornitologiche in provincia di Bergamo. *Picus* 19: 21-25.
- GUERRA M., 1989 - Nidificazione di Rondine montana, *Ptyonoprogne rupestris*, (Scop.) in Bergamo città negli anni 1989-1990. *Riv. Museo Civ. Sc. Nat. "E. Caffi"*, 14: 123-134.

INDIRIZZO DEGLI AUTORI

AMBRUSCHI GIAMPIETRO
Via Monte Grem,3 - Bergamo

CAIRO ENRICO
Via Alcaini,8 - Bergamo

GIOVINE GIOVANNI
Via Casalino 5/h - Bergamo