

Mario GUERRA*

CONSIDERAZIONI SULLA FAUNA ORNITICA DEI FONTANILI

Queste brevi considerazioni sulla presenza di una fauna ornitica in prossimità dei fontanili non riconoscono alle spalle (come i precedenti capitoli sulla fauna invertebrata) una minuziosa casistica di osservazioni scandite nel tempo e nello spazio in forma ordinata e metodica. Sono bensì il risultato di sopralluoghi abbastanza casuali, soprattutto effettuati nella regione "cremasca", in due distinti periodi il primo dei quali principia da quando (1949) si andavano affermando le tendenze alla monocoltura, senza che peraltro le esigenze legate alla meccanizzazione dei mezzi agricoli e l'impiego di correttivi chimici avessero notevolmente ridimensionato -impoverendoli- gli aspetti strutturali tipici del paesaggio agricolo della pianura padana irrigua.

L'ecosistema naturale originario di questa pianura (fatto di superfici boschive e di acquitrini alternati a dossi sabbiosi) risulta alterato in epoche remote e sostituito -per intervento antropico- da un ecosistema artificiale, definito "agricolo irriguo", che tuttavia, proprio in certe sue caratteristiche espressioni (quali le marcite, le risaie, i canali, le rogge e -appunto- i fontanili), può evocare rimembranze di condizioni antiche. Va da sé che, per quanto attiene l'avifauna, il fontanile, anche per la precarietà delle sue condizioni e soprattutto per la esiguità della sua superficie (cui consegue, automaticamente, la relativa modestia della copertura vegetale arborea) non può essere considerato "area di rifugio" di popolazioni ornitiche. In altre parole le specie di uccelli che frequentano i fontanili sono le stesse che frequentano i filari di pioppi lungo i corsi d'acqua o i platani o gli olmi o le robinie che si allineano ai bordi delle strade campestri o dividono appezzamenti di terreno, delimitando proprietà distinte e realizzando quella mappa di "tessere" perlopiù rettangolari che sono elemento primario del paesaggio padano. E' intuitivo che, quanto più limpida e intatta è l'acqua che scaturisce dalle polle e si avvia per l'asta in tenue declivio, tanto più facilitato risulterà l'insediamento di specie diverse di uccelli. Gli elenchi di specie segnalate si riferiscono a fontanili tipici della falda padana lombarda, cioè polle d'acqua affioranti in punti determinati (teste) e subito canalizzati; non considerano invece quei fenomeni ove si assiste ad un affioramento della falda su superfici anche molto vaste con la realizzazione di condizioni di tipo acquitrino o marcita. Ovvio che in questi ultimi casi le specie ornitiche rinvenibili aumentano notevolmente di numero, coinvolgendo buona parte della cosiddetta avifauna acquatica.

L'elenco che segue si riferisce essenzialmente a due distinti periodi: uno, che definirei "remoto", risalente agli anni che vanno dal 1949 al 1954 e relativo ai fontanili ed ai corsi d'acqua irrigui del territorio cremasco; l'altro, recentissimo (ed evidenziato con i nomi volgari in grassetto), riferito ai primi sei mesi dell'anno in corso (1992). Tutte le specie avvistate nel 1992 erano già state segnalate anche nel periodo "remoto", con le sole eccezioni di *Streptopelia decaocto* e *Remiz pendulinus*.

* Museo di Scienze Naturali di Bergamo

Ritengo che il significato di questo elenco sia molto discutibile, poiché dimostra soltanto che in corrispondenza dei fontanili è presente la medesima avifauna che compare in tutta la pianura padana, beninteso là ove le condizioni lo consentono; va anche considerato scontato che l'elenco stesso, protraendosi le indagini nel tempo, si arricchirà di molte altre specie indubbiamente presenti, quantomeno all'epoca dei passi, oppure che considerano il fontanile come prezioso riferimento per abbeverarsi nelle ore più calde dell'estate.

ELENCO DELLE SPECIE ORNITICHE

- Tuffetto - *Podiceps ruficollis*
 Sgarza ciuffetto - *Ardeola ralloides*
 Airone rosso - *Ardea purpurea*
Germano reale - *Anas platyrhynchos*
 Alzavola - *Anas crecca*
 Marzaiola - *Anas querquedula*
 Poiana - *Buteo buteo*
 Albanella - *Circus sp.*
Gheppio - *Falco tinnunculus*
 Lodolaio - *Falco subbuteo*
 Voltolino - *Porzana porzana*
 Schiribilla - *Porzana parva*
Gallinella d'acqua - *Gallinula chloropus*
 Pavoncella - *Vanellus vanellus*
 Piro piro piccolo - *Tringa hypoleucos*
 Beccaccino - *Gallinago gallinago*
 Frullino - *Lymnocyptes minimus*
Colombaccio - *Columba palumbus*
 Tortora - *Streptopelia turtur*
Tortora dal collare orientale - *Streptopelia decaocto*
Cuculo - *Cuculus canorus*
 Allocco - *Strix aluco*
 Martin pescatore - *Alcedo atthis*
Upupa - *Upupa epops*
Rondine - *Hirundo rustica*
 Balestruccio - *Delichon urbica*
 Cutrettola - *Motacilla flava*
 Ballerina bianca - *Motacilla alba*
Averla piccola - *Lanius collurio*
 Averla capirossa - *Lanius senator*
 Averla cenerina - *Lanius minor*
Rigogolo - *Oriolus oriolus*
 Storno - *Sturnus vulgaris*
- Ghiandaia - *Garrulus glandarius*
 Gazza - *Pica pica*
 Corvo - *Corvus frugilegus*
Cornacchia grigia - *Corvus corone comix*
 Scricciolo - *Troglodytes troglodytes*
 Pigliamosche - *Muscicapa striata*
Usignolo di fiume - *Cettia cettii*
 Forapaglie macchiettato - *Locustella naevia*
Forapaglie - *Acrocephalus schoenobaenus*
 Cannaiola verdognola - *Acrocephalus palustris*
 Cannaiola - *Acrocephalus scirpaceus*
 Cannareccione - *Acrocephalus arundinaceus*
 Canapino - *Hippolais polyglotta*
Capinera - *Sylvia atricapilla*
 Beccafico - *Sylvia borin*
 Sterpazzola - *Sylvia communis*
 Beccamoschino - *Cisticola juncidis*
 Fiorrancino - *Regulus ignicapillus*
 Stiacchino - *Saxicola rubetra*
 Codirosso - *Phoenicurus phoenicurus*
Pettirosso - *Eriothacus rubecula*
Usignolo - *Luscinia megarhynchos*
Merlo - *Turdus merula*
 Codibugnolo - *Aegithalos caedans*
Cincia bigia - *Parus palustris*
 Cinciallegra - *Parus major*
Pendolino - *Remiz pendulinus*
 Passera d'Italia - *Passer domesticus*
 Passera mattugia - *Passer montanus*
Fringuello - *Fringilla coelebs*
 Verdone - *Carduelis chloris*
Cardellino - *Carduelis carduelis*
 Zigolo giallo - *Emberiza citrinella*
 Ortolano - *Emberiza hortulana*